



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
Direction des Admissions et Concours

**ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PARIS
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON**

CONCOURS D'ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

OPTION SCIENTIFIQUE

MATHEMATIQUES II

Samedi 15 Mai 1999, de 8h. à 12h.

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.

Ils ne doivent faire usage d'aucun document ; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

La partie 1 présente la loi du χ^2 (lire khi-deux) et certaines de ses propriétés. La partie 2 présente une application de la loi du χ^2 . La partie 3 considère, sur un exemple, un test statistique, reposant sur les résultats des parties 1 et 2.

Notation

Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes, on note $cov(X, Y)$ leur covariance, si celle-ci existe.

Partie 1

Soit r un entier non nul. On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi du χ^2 à r degrés de liberté si et seulement si X

suit la loi Γ de paramètres 2 et $\frac{r}{2}$, c'est-à-dire si X admet pour densité la fonction f_r définie par :

$$\forall x > 0, f_r(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{r}{2}\right) 2^{\frac{r}{2}}} x^{\frac{r}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \quad \forall x \leq 0, f_r(x) = 0.$$

1) Déterminer l'espérance et la variance d'une variable X suivant la loi du χ^2 à r degrés de liberté.

2) a) Montrer que pour tout $\lambda > 0$, pour tout entier n non nul :

$$e^\lambda = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!} + \int_0^\lambda e^{\lambda-t} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

b) Soit Y_λ une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ et X_{2n} une variable aléatoire suivant la loi du χ^2 à $2n$ degrés de liberté. Montrer que $P(X_{2n} > 2\lambda) = P(Y_\lambda < n)$.

c) Ecrire une fonction en langage Pascal de paramètres n entier et x réel qui retourne la valeur de $P(X_{2n} > x)$.

d) A l'aide de la table des lois de Poisson donnée en annexe, donner l'allure de la fonction F_6 , fonction de répartition d'une variable suivant la loi du χ^2 à 6 degrés de liberté en précisant les valeurs de $F_6(0)$, $F_6(4)$, $F_6(8)$.

3) Soit k un entier non nul et X_1, \dots, X_k des variables indépendantes gaussiennes centrées réduites.

a) Déterminer la loi de X_1^2 .

b) En déduire la loi de $X_1^2 + \dots + X_k^2$ (on admettra que les variables X_1^2, \dots, X_k^2 sont indépendantes).

c) Tracer sur un même graphique l'allure des fonctions de répartition de deux variables aléatoires, l'une suivant la loi du χ^2 à r degrés de liberté et l'autre suivant la loi du χ^2 à r' degrés de liberté, avec r et r' deux entiers non nuls tels que $r < r'$.

Partie 2

Soit n et s des entiers supérieurs ou égaux à 2. On considère une urne contenant des boules de couleurs C_1, \dots, C_s . Les

boules de couleur C_i sont en proportion p_i . On a donc $\sum_{i=1}^s p_i = 1$ et on suppose que, pour tout i , $p_i > 0$.

On effectue n tirages successifs d'une boule avec remise.

Pour tout i de $\{1, \dots, s\}$, on note X_i la variable aléatoire égale au nombre de boules de couleur C_i obtenues à l'issue des n

tirages. On remarque que la variable X_i dépend de n et que $\sum_{i=1}^s X_i = n$.

On définit la variable aléatoire U_n par :
$$U_n = \sum_{i=1}^s \frac{(X_i - np_i)^2}{np_i}.$$

A. Etude des variables X_i .

1) Déterminer la loi de X_i , son espérance et sa variance.

2) Soit $(i, j) \in \{1, \dots, s\}^2$ tel que $i \neq j$. Déterminer la loi de $X_i + X_j$ et sa variance.

En déduire que $\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$.

B. On suppose dans cette partie que $s = 2$.

1) Montrer que $U_n = Z_1^2$ où $Z_1 = \frac{X_1 - np_1}{\sqrt{np_1 p_2}}$.

2) a) Par quelle loi peut-on approcher la loi de Z_1 lorsque n est grand?

b) Montrer que la suite (U_n) converge en loi vers la loi du χ^2 à 1 degré de liberté, quand n tend vers l'infini (on demande une démonstration précise).

C. On suppose dans cette partie que $s = 3$ et que $p_1 = p_2 = \frac{1}{4}$ et $p_3 = \frac{1}{2}$.

On pose $Z_1 = \frac{2}{\sqrt{n}} \left(X_3 - \frac{n}{2} \right)$ et $Z_2 = \sqrt{\frac{2}{n}} (X_1 - X_2)$.

1) Montrer que $U_n = Z_1^2 + Z_2^2$.

2) Déterminer les espérances et variances de Z_1 et Z_2 et $\text{cov}(Z_1, Z_2)$.

3) Par quelle loi peut-on approcher la loi de Z_1 lorsque n est grand?

4) Pour i élément de $\{1, \dots, n\}$, on définit la variable T_i par : $T_i = 1$ si au i ème tirage on a obtenu une boule de couleur C_1 , $T_i = -1$ si au i ème tirage on a obtenu une boule de couleur C_2 , $T_i = 0$ si au i ème tirage on a obtenu une boule de couleur C_3 .

a) Exprimer $X_1 - X_2$ à l'aide des variables T_i .

b) En déduire que l'on peut approcher la loi de Z_2 , quand n est grand, par la loi normale centrée réduite.

5) On admettra l'approximation suivante : n est supposé grand et sous cette hypothèse, Z_1 et Z_2 sont des variables indépendantes gaussiennes centrées réduites.

Quelle est la loi de U_n ?

6) On suppose avoir défini dans un programme Pascal :

Type Tableau = Array[1..100] of integer;

a) Ecrire une procédure *procedure Tirage*(var C : Tableau); permettant de simuler le tirage avec remise de 100 boules dans une urne contenant des boules de couleur C_1 ou C_2 ou C_3 en proportion respectivement $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$.

L'élément $C[i]$ vaut 1, 2 ou 3 et représente la couleur de la i ème boule tirée (C_1 , C_2 ou C_3). On utilisera la fonction *random* : *random*(4) retourne un entier aléatoire compris entre 0 et 3.

b) Ecrire une fonction *Difference* de paramètre C qui retourne la valeur de $X_1 - X_2$.

D. On suppose désormais s entier quelconque supérieur ou égal à 2.

1) On pose $Y_i = \frac{X_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$. On note M la matrice de covariance des variables Y_1, \dots, Y_s .

Montrer que $M = I - N$ où I est la matrice unité et N la matrice dont le terme en ligne i et colonne j vaut $\sqrt{p_i p_j}$.

2) Montrer que $N^2 = N$ et déterminer le rang de N .

3) Montrer qu'il existe une matrice Q telle que ${}^t Q Q = I$ et telle que $M = Q J_{s-1} {}^t Q$ où J_{s-1} est la matrice carrée d'ordre s , diagonale, dont les $s-1$ premiers éléments diagonaux sont égaux à 1 et le dernier est nul. (On ne demande pas de calculer explicitement la matrice Q).

4) On définit les variables Z_1, \dots, Z_s par :

$$\begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_s \end{pmatrix} = {}^t Q \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_s \end{pmatrix}.$$

On note a_{ij} l'élément de la ligne i et de la colonne j de ${}^t Q$. Exprimer chaque Z_i en fonction de Y_1, \dots, Y_s et des a_{ij} .

Montrer que les variables Z_i sont centrées.

En utilisant la bilinéarité de la covariance, déterminer la matrice de covariance de Z_1, \dots, Z_s .

Qu'en déduit-on pour la variable Z_s ?

5) On admettra l'approximation suivante : n est supposé grand et sous cette hypothèse, Z_1, \dots, Z_{s-1} sont des variables indépendantes gaussiennes centrées réduites.

Montrer que U_n suit la loi du χ^2 à $s-1$ degrés de liberté.

Partie 3

On s'intéresse à la répartition le long de l'année des naissances en Suède dans les années 1930.

Une statistique a été réalisée pour les 4 périodes dont les proportions p_i de journées dans l'année sont les suivantes :

période T_1 : Avril - Juin $p_1 = 0,250$

période T_2 : Juillet-Août $p_2 = 0,169$

période T_3 : Septembre - Octobre $p_3 = 0,167$

période T_4 : Novembre - Mars $p_4 = 0,414$.

On dispose d'un échantillon de 8000 naissances en Suède dans les années 1930, regroupées suivant les quatre périodes définies ci-dessus, selon les proportions f_i suivantes :

période T_1 : $f_1 = 0,264$

période T_2 : $f_2 = 0,173$

période T_3 : $f_3 = 0,159$

période T_4 : $f_4 = 0,404$.

On fait l'hypothèse que, parmi la population observée, le jour (aléatoire) de naissance dans l'année d'un enfant suit une loi uniforme. On confronte cette hypothèse à l'échantillon.

On donne les valeurs numériques suivantes :

- $0,99 = F_3(11,3)$ où F_3 désigne la fonction de répartition de la loi du χ^2 à 3 degrés de liberté,

- $8000 \sum_{i=1}^4 \frac{(f_i - p_i)^2}{p_i} = 12,03$.

En introduisant des variables aléatoires convenables X_1, X_2, X_3, X_4 et la variable U_n associée, justifier le rejet de l'hypothèse de répartition uniforme des naissances au cours de l'année.

ANNEXE

Extraits de la table cumulée des lois de Poisson $P(\lambda)$: valeurs de $P(X_\lambda \leq x)$.

$x \backslash \lambda$	1	2	3	4	5	6	7
0	0,3679	0,1353	0,0498	0,0183	0,0067	0,0025	0,0009
1	0,7358	0,4060	0,1991	0,0916	0,0404	0,0174	0,0073
2	0,9197	0,6767	0,4232	0,2381	0,1247	0,0620	0,0296
3	0,9810	0,8571	0,6472	0,4335	0,2650	0,1512	0,0818
4	0,9963	0,9473	0,8153	0,6288	0,4405	0,2851	0,1730
5	0,9994	0,9834	0,9161	0,7851	0,6160	0,4457	0,3007